



Bird-Export.com

Approved European quarantine centre n° BE-VQ 3008

Contact: luc wolfs

- T +32 (0)496 10 20 67
- E info@bird-export.com


Een groep van vogelliefhebbers/kwekers

Mail ons:

**UW VERZOEK WORDT DOORGEGEVEN
AAN PLAATSELIJKE VANGERS!**

Gespecialiseerd in
**'VRUCHTEN- EN
INSECTENETENDE' VOGELSOORTEN**

uit de volgende regio's :



visit our website: www.bird-export.com

FOK MET DE BLAUWGRIJZE TANGARA -

Thraupis episcopus

Door Ger Tummers / foto Alex Mulder

Mijn verkenningen in vogelland hebben inmiddels ook geleid tot het experimenteren met vruchteneters. In mijn geval met een paar blauwgrijze tangara's. Deze vogels heb ik vorig jaar november overgenomen van clubgenoot Alex Mulder die ze in september had gekocht op de vogelmarkt te Zwolle.

Heel vroeger begonnen met zaadeters, daarna insecteneters en nu dus ook vruchteneters. In feite maken deze drie vogelsoorten nu allemaal deel uit van mijn vogelbestand. Van de zaadeters heb ik alleen nog de rode kardinalen.

De blauwgrijze tangara's hebben overwinterd in een zeer ruime kooi in mijn schuur, mijn vroegere "winterstalling". Ze

werden niet meteen in een grote broedvlucht geplaatst omdat ze nogal schuw zijn. Doordat ik vaak in deze schuur kom en verblijf, hoopte ik dat de vogels minder schuw zouden worden door het gedwongen contact met de verzorger. Eind maart heb ik ze in de broedvlucht geplaatst en ze vielen meteen in een fikse rui. De vogels zijn toch nog steeds schuw, zeker vergeleken met de andere vogelsoorten die ik heb.



Ridderkerkse Vogelhandel Henk van Os B.V.

Import & export

*De grootste en mooiste
sortering vogels van Nederland*

Verkoop uit binnen- en buiten volières
Tevens inkoop en inruil van alle soorten vogels
Ook voor al Uw Voeders en benodigdheden.

Ringdijk 22 - 28 2981 EW Ridderkerk
Tel: 0180-414292 Fax 0180-432686

www.vanosbird.nl

E-mail: vanos.bird@wxs.nl

Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 9-16 uur Zaterdag 9-17 uur

Ofschoon het kleine vogels (16 cm) zijn heb ik ze toch in mijn grootste type broedvlucht geplaatst, omdat ze toch nog tamelijk schuw zijn. Afmetingen (overdekte) buitenvlucht zijn: 4m lang x 1,8m breed x 2,5m hoog gemiddeld (schuin aflopend van 2,80m naar 2,25m). Het verwarmde nachthok heeft de afmetingen: 1,5m l x 1,8m br x en 2,5m h (gemiddeld). De wintertemperatuur in het nachthok is 10° C. De gaskachel in het nachthok brandt trouwens het hele jaar. In de zomer betekent dat meestal dat alleen de waakvlam brandt. Dat is net

genoeg om te voorkomen dat er condensvorming in de nachthokken optreedt.

Het algemene verhaal over deze vogels laat ik hier achterwege. (Noot redactie; wij hebben hierover een stukje aan het eind van dit artikel geplaatst). De belangrijkste informatie die je wellicht nodig hebt in je eigen praktische situatie is het type nest, nestmateriaal en de nesthoogte. Ik heb hierover en trouwens over andere van belang geachte zaken, contact gehad met enkele ervaren tangaraliefhebbers binnen onze club (Udo Eelman, Jo Penders, Ruud van der Donk en Alex Mulder).

De ruimte is niet beplant, wel zijn er takken aangebracht aan de wand om de vogels wat privacy te verschaffen. Deze takken zijn van coniferen en naaldbomen. De drie aangeboden nestgelegenheden in de buitenvlucht bevinden zich op ca. 2m hoogte. Het type nesten zijn een grote kanarienesskast (goudvink), een komvormig nest en een halfopen nest. De nestkasten zijn verborgen tussen de aangebrachte takken. Ook in de binnenruimte zijn twee nestgelegenheden aangebracht, eveneens verscholen tussen de takken. Voor het nestmateriaal heb ik van alles gegeven wat ik in huis heb.

In de schuur was al duidelijk dat de tangara's een paar vormden, de man voerde de pop af en toe. Man en pop zijn als ze naast elkaar zitten nog net van elkaar te onderscheiden.

De voeding die de tangara's vanaf het begin hebben gekregen ziet er als volgt uit. Een stukje banaan waarbij de schil over de lengte voor een klein deel wordt verwijderd. De banaan wordt vervolgens in de lengterichting in dunne plakjes gesneden (in de schil), tussen deze plakjes wordt royaal fruitmix toegevoegd, de plakjes worden vervolgens weer tegen elkaar aangedrukt en in een net passend bakje gelegd. Tevens wordt er een beetje honingwater aan toegevoegd. Het geheel vormt nu een vrijwel complete voeding. Daarnaast wordt er eigengemaakt eivoer verstrekt (zie hiervoor VE-3,

magnetronvoer). Dit gemalen of in kleine dobbelsteentjes gesneden eivoer wordt eveneens extra bevochtigd met wat honingwater. Ook dit is een vrijwel compleet voer. Het enige levende voer dat ze krijgen zijn buffalo's. Ten slotte is er altijd wat droog, ijzerarm universeelvoer aanwezig.

In de broedperiode wordt precies hetzelfde voer aangeboden als in het rustseizoen, zij het dat in de broedperiode het eiwitgehalte is verhoogd zowel in het eivoer als in de fruitmix (banaan). De vogels "zien" hier echter niets van! Van het aangeboden voer zijn de banaan, het eivoer en de buffalo's in principe geschikt voor het grootbrengen van de jongen.



Vogelboeken I V V

**Het Internationale Vogelboeken Verzendhuis heeft
méér dan 2500 titels op voorraad.**

**Internationale Vogelboeken Verzendhuis
"De Oldhorst" Zuiderzeestraatweg 415
8091 PA Wezep**

Tel: 0525 - 631139 fax: 0525 - 633123

www.birdbooks.nl e-mail: birdbooks@introweb.nl

Alle drie bevatten ze genoeg vocht en ze zijn alle drie een compleet voer met een relatief hoog eiwitgehalte! De buffalo's worden bepoederd en hebben van tevoren een speciaal voer voor insecten gehad.

En dan nu de broedresultaten. Voor het eerste nest werd de grote kanarienestkast uitgekozen. Twee eitjes, ca. twee weken

broeden en twee jongen. Vanaf de tweede dag zijn er naast de levende buffalo's ook "gepasteuriseerde" buffalo's aangeboden. Dat zijn zachte/weke dode buffalo's. Deze maak je door levende buffalo's te spoelen met heet kraanwater. Heet kraanwater heeft een temperatuur van minstens 60° C. In de praktijk wellicht tussen de 60° en 70° C? De op deze manier "behandelde" buffalo's worden zacht. Bovendien worden ze aangeboden in een laagje water dat ze wellicht ook nog ten dele opnemen. Aan dat waterlaagje heb ik ook nog wat fruitmix toegevoegd voor extra vitamines/mineralen.

De hierboven genoemde manier om buffalo's aan te bieden heb ik overgenomen van een vogelkennis bij mij in de buurt (Jan Willen Klein Tiessink, bij velen beter bekend als de man van het kunststof volièregaas Afcon).

Het grote verschil tussen gepasteuriseerde en gekookte buffalo's is dat de eerste weker worden en de laatste hard. Hetzelfde geldt trouwens ook voor meelwormen. Ook pinky's blijven heel week! Doch met pinky's blijft het risico van salmonellavergiftiging. Salmonella's overleven wellicht de hete kraanbehandeling?

Na acht dagen heb ik ook af en toe wat krekels aangeboden. Deze werden aanvankelijk graag genomen, doch na een week in veel mindere mate. Alle aangeboden voedsel, behalve het droge universeel, werd opgenomen tijdens het grootbrengen van de jongen. De jongen verlieten na 16 dagen het nest en zien er bijna hetzelfde uit als de ouders. Zij zijn echter wat matter van kleur. De jongen zijn niet geringd omdat het mijn eerste tangara's waren en ik niets wilde verstoren. Ik weet trouwens niet eens hoe de eitjes er uit zien! Ik heb ze slechts betast.

Een eventueel tweede nest zou ik natuurlijk wel ringen. Dat tweede nest kwam al snel. Deze keer in de open nestkast.

Tijdens het broeden is het voedselaanbod teruggebracht tot nat eivoer, "aangeklede" banaan en levende buffalo's. Het bleek dat de gepasteuriseerde buffalo's niet meer werden opgenomen toen de jongen waren uitgevlogen.



Groothandel Voedseldieren

o.a. (vanaf prijzen):

Meelwormen kg	€ 9,00	Pinky's ltr	€ 9,20
Buffalowormen ltr	€ 10,25	Krekels ds	€ 1,50
Moriowormen kg	€ 20,45	Sprinkhanen ds	€ 2,25
Rozenkeverlarven ps	€ 0,14	Wasmotlarven ds	€ 1,70
Regenwormen kg	€ 21,55	Korvimin 50 gr	€ 7,50

Alles kan geheel zonder risico per post worden verzonden door heel Nederland! Niet goed = geld terug!

Liefst bestellen via www.duiveman.nl

Mobiel: 06 524 284 13 (Tim)

Voor vragen: info@duiveman.nl

In deze periode had ik weinig tijd om de vogels te observeren en heb ik evenmin bijgehouden wanneer ze weer zijn gaan broeden. Wel had ik gezien dat de eerste jongen al zelf aten en daarom heb ik op een gegeven moment maar eens gevoeld of er al nieuwe jongen waren. Die waren er inderdaad en wel zodanig dat ze al te groot waren om te ringen! Dus mijn vereenvoudigde voedselaanbod was afdoende om de jongen groot te brengen. Inmiddels zijn ook de jongen van het tweede nest uitgevlogen. Zowel deze als die van het eerste nest zien er gezond en vitaal uit. Die van het tweede nest zijn dus grootgebracht met eivoer, banaan en levende buffalo's. Nat eivoer en buffalo's zijn altijd aanwezig. Banaan sla ik wel eens

een dag over om ze te dwingen het andere voedsel te nemen. En dat doen ze!

Ben ik nu een ervaren tangarafokker? Nee, natuurlijk niet. Wel kun je stellen dat ik een heel goed fokstel heb. Bovendien accepteren ze de ruimte die ik heb aangeboden. Waar ik toch wel een beetje trots op ben is dat de jongen voor een niet onbelangrijk deel zijn grootgebracht met het zelfgemaakte eivoer.

Korte beschrijving van de blauwgrijze tangara *Door Ger Essenberg*

De blauwgrijze tangara behoort tot het geslacht *Thraupis* waarvan 8 soorten en vele ondersoorten bekend zijn.

De *Thraupis* soorten zijn zeer actieve, rusteloze, middelgrote tangara's (15 tot 18 cm) die een zeer groot verspreidingsgebied hebben. Ze komen voor vanaf Zuid-Mexico tot in Noord-Chili en Midden-Argentinië.

In hun herkomstlanden zijn deze vogels zeer populair. Ze spelen er zowat dezelfde rol als hier onze merels en lijsters. Ze komen voor in elke omgeving, met uitzondering van het dichte, oorspronkelijke oerwoud en van de te droge, woestijnachtige streken.

Wat begroeiing betreft geven ze de voorkeur aan een gevarieerd landschap, nl. halfopen begroeiing, oerwoudranden, rivieroeveren en begroeide wegranden; dus zowat overal waar verspreid groeiende bomen en struikgewas voorkomen. Grote bomen met een open kruin zijn noodzakelijk om deze tangara's aan te trekken.

Thraupis soorten behoren tot de weinige tangara's die men "cultuurvolgers" kan noemen. Ze komen nl. ook zeer talrijk voor in plantages, parken, tuinen, enz.

Het algemene gedrag en de levenswijze van de verschillende *Thraupis* soorten lijken erg veel op elkaar, zodat we de andere soorten met de welbekende blauwgrijze tangara kunnen vergelijken.

Van de blauwgrijze tangara - *Thraupis episcopus* zijn maar liefst 13 ondersoorten bekend. Deze ondersoorten bestaan uit 2 verschillende

groepen. Een groep van 6 ondersoorten bezit diepblauwe of purper- tot violetblauwe schouderplekken en de andere groep van 7 ondersoorten min of meer witte schouderplekken. Van deze laatste



groep is de Witschouder blauwgrijze tangara - *Thraupis episcopus caerulea* bij ons het meest bekend. De broedtijd is variërend en loopt per landstreek van januari tot september. Ze voeden zich vooral met bessen, vruchten en insecten; onder andere vliegende termieten die ze wel eens vangen op vliegenvangerswijze.

Verspreidingsgebieden Thraupis episcopus.

CONSTRUCTIE- en MONTAGEBEDRIJF BOXTEL

**Te koop aangeboden - Magazijnopruiming
Polycarbonaat platen (stegdoppel) en bijbehorende profielen**

Maak nu Uw volières tochtlicht en bescherm Uw kostbare vogels
tegen de gure wind en sneeuw.

Zeer geschikt om een serredak of carport te maken

We hebben de platen op alle lengtes en in diktes van
4mm, 6mm, 8mm, 10mm en 16mm, in opaal en transparant.

Al deze platen hebben een zeer hoge isolatiewaarde
Verder div.rvs-bevestigingsmiddelen en lichtkoepels.

Hemelrijk 4 - 5281 PS BOXTEL

Tel. 06 22791347 of 0411 611189

Fax. 0411 611962

e-mail aapc@hotmail.com

VERZAMELBANDEN voor de Vogelexpressen **VIDEOBANDEN**

Deze zijn tijdens de clubdagen te verkrijgen. Voorradig zijn:
Birding in Gambia 2 en 3, Birding in Goa 1 en 2, Birding in Sri Lanca,
Birding in Lesvos, Birding in Tobago, Birding in Trinidad, Birding in
Southern Africa en Birding in Israël.