

Tangara's

Inleiding

Tangara's zijn nooit heel veel gehouden/gekweekte vogels geweest. Na de importstop zijn veel prachtige soorten helaas al snel verdwenen of nagenoeg verdwenen uit onze volières. Toch zijn er altijd mensen geweest die met deze mooie vogels zijn blijven kweken. Gezien de kweekverslagen in o.a. De Vogelexpressie en het aantal soorten dat op de laatste clubshow aanwezig was lijkt er desondanks een kleine opmars gaande. Het aanbod dat er is, is heel beperkt. Maar wellicht dat juist daarom alles op alles gezet wordt om resultaten te halen. Er is een klein groepje kwekers in Nederland die zich op tangara's richten. Zij zijn er in geslaagd met een aantal prachtige soorten mooie kweekresultaten te halen. Mede hierdoor is het mogelijk dat we deze vogels nog jaren kunnen blijven zien in onze volières. Al met al reden genoeg om een aantal aspecten rond het houden van tangara's onder de aandacht te brengen.

Algemeen

Tangara's zijn vruchtenetende vogels uit Midden- en Zuid Amerika, een enkele soort komt voor in Noord Amerika. Tangara's variëren in grootte tussen de 9 en 29 cm. Veel soorten spreken tot onze verbeelding door hun schitterende kleurenpracht. Vooral de soorten binnen het geslacht tangara zijn kleurrijk. De familie *Thraupidae* (Tangara's) bestaat uit 64 geslachten die op hun beurt weer uit 283 soorten bestaan. In totaal zijn er 788 ondersoorten. Tangara's zijn hoofdzakelijk vruchteneters maar eten daarnaast ook insecten. Ook jonge tangara's worden vooral met insecten groot gebracht, zeker in de eerste weken. De meestal cupvormige nesten bestaan uit 2 of 3 eieren, bij de *Chlorophonia*'s en *Euphonia*'s uit 3 of 4 eieren. Naast de genoemde geslachten behoren ook de *Thraupis*, de *Cyanerpes*, de *Ramphocelus*, de *Tachyphonus*, en de *Dacnis* soorten tot de voor ons bekendere tangara's.

Aanschaf

Bij de aanschaf van nieuwe tangara's is het goed een aantal zaken in acht te nemen. Dit geldt uiteraard voor alle vogels maar zeker bij vogels die niet meer zo makkelijk verkrijgbaar zijn.




Niets is meer frustrerend dan te zien dat nieuwe vogels uitvallen of bijvoorbeeld achteraf uw vogelbestand besmetten. Het is mij regelmatig zelf overkomen in de eerste periode nadat ik begonnen was met het houden van tangara's. Veel uitval onder nieuw aangeschafte tangara's.

Wanneer vogels aangeschaft worden bij een bekende, vertrouwde kweker en het zijn jonge, geringde vogels dan is een paar dagen acclimatiseren waarschijnlijk voldoende. Maar vaak worden deze vogels in de handel gekocht. Het is bij alle nieuw aangeschafte vogels aan te raden maar zeker in dit geval is een periode in quarantaine geen overbodige luxe. Bij voorkeur is dit een ruimte geheel apart van de andere vogelverblijven. Wanneer we van nieuw aangeschafte vogels mest laten onderzoeken kunnen we al veel te weten komen over de vogels. Al oogt een vogel gezond, dit zegt niet alles. Ik heb in het verleden tangara's aangeschaft waarbij uit mestonderzoek bleek dat 1 tangara wormen, coxidiëse en schimmels bij zich had.

Van Tendeloo Eric

- * **Zaad-, insecten-, nectar- en vruchtenetende vogels**
- * **Diverse soorten voeders en toebehoren**
- * **Sportieve prijzen**



BOUWELSE STEENWEG 217 - 2560 NIJLEN – BELGIE

Openingstijden: Woensdag t/m Vrijdag 13.00 - 18.00 uur.

Zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur.

Zondag 10.00-16.00 uur

Tel: 0032-3-4816697, Fax. 0032-3-4817814

www.vogelsvantendeloo.com

E-mail: vogels.van.tendeloo@skynet.be

Deze vogel leek op het oog gezond. Wat zou er allemaal kunnen gebeuren als deze vogel direct bij onze andere vogels geplaatst zou worden. De kans op besmetting is aanzienlijk. Bij tangara's die al langere tijd bij mij verblijven worden wormen en coxidiöse nagenoeg nooit aangetroffen. We kunnen door op de juiste manier met nieuwe vogels om te gaan veel leed voorkomen. Allereerst is het verstandig de nieuwe tangara's apart te zetten bij een temperatuur van rond de 20 graden. De tangara's kunnen zo aan het (nieuwe) voer wennen en u kunt ze rustig observeren.

Wanneer u na aanschaf binnen enkele dagen mest laat onderzoeken, bij voorkeur van elke vogel apart, dan weet u snel of het wellicht nodig is de vogels te behandelen. Dit kan dan in de quarantaine periode gebeuren. Blijkt er niets in de mest te worden aangetroffen dan kunnen de tangara's na twee a drie weken in hun eigenlijke verblijf geplaatst worden. Blijken er wel ziekteverwekkers aanwezig te zijn is het aan te raden een week na behandeling de mest opnieuw te laten onderzoeken of de vogels nu vrij zijn. In dit geval kan de periode van quarantaine wat langer duren. Het lijkt misschien veel gedoe maar in de praktijk valt dit mee. Natuurlijk is ook dit allemaal geen garantie voor succes maar het kan veel narigheid en teleurstellingen helpen voorkomen.

Huisvesting

Zoals voor alle vogels geldt is huisvesting een belangrijk element om het welzijn en de gezondheid van tangara's te waarborgen.

Tangara's kunnen op verschillende manieren gehuisvest worden. Ze worden gehouden in broed- of kweekkooien, volières en er zijn mensen die deze vogels in een verwarmde kas houden. Al deze manieren zijn mogelijk en in alle drie de vormen van huisvesting worden resultaten behaald. Wel hebben al deze manieren van huisvesten hun voor en tegens. Een kweekkooi neemt relatief weinig ruimte in beslag, is goed schoon te houden en er is een optimale controle op de vogels. Ook wordt vaak 1 koppel per kooi gehouden en is het eenvoudig de man apart te zetten als dit nodig is. De andere kant is dat kweekkooien vrij arbeidsintensief zijn. In principe gedijen tangara's prima in kweekkooien en gaan ze er vrij makkelijk tot broeden over.



Vogel & Zaadhandel Geldof & Zn.



Eén van Nederlands grootste vogelspecialzaken

In en verkoop van **alle** soorten vogels aan particulieren,
winkels en handelaren in binnen en buitenland.

**140 volières met een totaal van
± 7000 vogels op voorraad.**

(Voor levering van vogels graag een telefonische afspraak maken)



*Verkoop van alle vogelbenodigdheden
Verkoop van topkwaliteit zaden
Braet, Beyers, Versele laga, en Victoria*



Tevens verkoop
van
kleindiervoer,
hondenvoer,
paardenvoer,
kippenvoer,
schapenvoer,



eendenvoer, fazantenvoer, enz.
Gegarandeerde Topkwaliteit!!!!

Prof. Keesomweg 10a, 5144NM Waalwijk N-Brabant (NL)

Tel. 0416-344641 / 06-26790571

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag 10.00 u tot 17.00 u www.vogelhandelgeldof.nl

Toch blijkt het lastig tangara's over langere tijd gezond te houden in kleinere kooien. Het kan er mee te maken hebben dat tangara's vrij stressgevoelig zijn. Ook zijn tangara's vrij vatbaar voor schimmelinfecties. De kans hierop is in een kleinere kooi ook groter dan in een volière bijvoorbeeld. De minimale adviesmaat voor een kweekkooi voor tangara's is 200 x 60 x 60 cm.

Een volière met (verwarmd) nachthok lijkt ideaal voor de meeste tangara soorten. Ruimte om bij stress verder weg te kunnen vliegen, frisse buitenlucht en een lagere besmettingsdruk. Hier kunnen ze het jaar rond in verblijven. Bij voorkeur worden tangara's per koppel gehuisvest. Dit zal de kweekresultaten ten goede doen komen. Het samen zetten met andere (tangara) soorten kan goed gaan. Hier zijn diverse voorbeelden van. Wel blijft het oppassen of het goed blijft gaan. Tangara's kunnen namelijk behoorlijk agressief zijn tegen elkaar waarbij gevechten de dood van een van de vogels kan betekenen.

Een prachtige manier om tangara's te houden is in een verwarmde beplante kas. Op deze manier kan de natuurlijke habitat enigszins nabootst worden. Hiermee creëer je een stuk beleving wat prachtig is. Kweekresultaten worden echter nogal eens verstoord en controle is vaak moeilijker.

Voeding

Tangara's leven in de natuur van vruchten en insecten. Met name als er jongen zijn is het belangrijk dat er insecten aanwezig zijn. Een goede voeding is van essentieel belang om onze tangara's in een goede conditie te krijgen en te houden. Als er jongen zijn is het zoals gezegd belangrijk dat er insecten aangeboden worden. Dit kunnen levende maar ook diepvriesinsecten zijn. Of u nu levende of diepvriesinsecten voert, van belang is dat de insecten goede voedingstoffen voor de jonge tangara's bevatten. Een standaard aanbod van een ijzerarm universeelvoer, fruit aangevuld met een geschikt eivoer volstaat in principe. Tangara's zijn gevoelig voor schimmels en fruit kan snel schimmelen. Bij voorkeur wordt dagelijks zoveel fruit gegeven dat dit na ongeveer een halve dag op is. Zeker in kweekkooien is het goed om fruitresten tijdig te verwijderen omdat dit anders zeker weer van de grond genomen wordt.

Tijdens de kweek kan eivoer incl. wat pinkies en buffalowormen dagelijks aangeboden worden.

In de rustperiode kan dit teruggebracht worden naar twee keer per week. Tegenwoordig zijn er diverse pellets in de handel die alles bevatten wat onze vogels nodig hebben. Gezien het punt van hygiëne en ziektegevoeligheid bij tangara's loont het zeker uit te proberen of wij onze tangara's geheel of gedeeltelijk op deze pellets kunnen krijgen. De vogels kunnen niet meer selecteren waardoor ze in principe binnen krijgen wat ze nodig hebben. Zelf ben ik dit al een tijdje aan het proberen en het heeft zeker een aantal voordelen. Ik week de pellets van te voren in water en over het algemeen worden de pellets door alle soorten graag gegeten. Ook jongen worden er vanaf de tweede week mee gevoerd. Maar nog niet alle soorten reageren er helemaal goed op. Als er jongen zijn worden er meer pinkies en buffalowormen gegeven. Daarnaast vooral in de eerste twee weken dagelijks een aantal in kleine stukjes geknipte wasmotlarven. Die bepoeder ik met een handopfok. Een prima eivoer dat goed zelf gemaakt kan worden is de bekende 'cake' van couscous en eieren. Het recept hiervan is te vinden op www.tanagerbreeders.nl, onder het kopje voeding.

Kweek

Wanneer de omstandigheden goed zijn, klimaat, licht en voeding zullen de meeste tangara's wel tot broeden over gaan. Gaat een koppel over langere tijd niet tot broeden over dan is er een grote kans dat een van de vogels iets onder de leden heeft of er andere factoren zijn die dit belemmeren zoals een niet klikkend koppel bijvoorbeeld. Vrijwel alle tangara soorten maken een cubvormig nest en broeden graag in de bekende tralie nestkastjes. De Zwaluw tangara (*Tersina viridis*) is hierop een uitzondering en broedt ook in dichte tropen of parkieten nestkastjes. Wat groen om het nestje kan als decoratie, maar is geen must. Als nestmateriaal wordt door bijna alle soorten vooral bruin kokostouw gebruikt. De bij ons ook bekende witte sisaltouw gebruiken bij mij alleen de Turquoise tangara's (*Tangara mexicana*). De blauwkoptangara's (*Tangara cyanicollis*) gebruiken bij mij nagenoeg alleen bruin kokostouw net als de goudtangara's (*Tangara arthus*).





Boven: De dikbekorganist (*Euphonia lanirostris*) is een tangara soort.
Foto; Genomen in Panama door Rick van Groningen.









Vogelspecialzaak: De Bosruiter
 Siervogels—kweekvogels—zangvogels
 Vogelbenodigdheden, alle soorten losse zaden,
 diverse speciale zaadmengelingen, levende
 voedseldieren en diepvriesinsecten.
 Door onze natuurlijke ligging zijn wij ook een
 rust- en oplaadpunt voor wandelaars en fietsers.







Tot ziens bij Jack en Carla
Turfstraat 36, 4714 SG Sprundel
www.bosruitervogelspecialzaak.nl
Tel. 0165-382782 Mobiel: 06-53594006




GESLACHTSBEPALING





Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in DNA onderzoek
 in alle soorten vogels, duiven en overige dieren


GESLACHT


ZIEKTE


VERWANTSCHAP


SOORTEN

Voor informatie bel (+31) 0598-619343 of ga naar www.gendika.com

De goudtangara's werken hun nest af met dode ficus of bamboe blaadjes als deze voorhanden zijn.

De legfels bestaan uit twee of drie eieren en bij de Chlorophonia's en Euphonia's drie of vier eieren. Zijn tangara's eenmaal begonnen dan gaan ze vaak lang door. Als ze in goede conditie zijn en vrij van ziektes blijven kunnen ze een lang broedseizoen prima aan. De broedtijd is 12 tot 14 dagen en kan per soort iets variëren. De *Tangara cyanicollis* broedt 12 dagen en de goudtangara bijvoorbeeld 14 dagen. Ringen geeft over het algemeen geen problemen en kan rond de vijfde dag.

In de natuur blijven jongen van eerdere rondes vaak bij de ouders en voeren mee met volgende rondes. In hele grote verblijven zou dit in gevangenschap ook kunnen maar in onze volières en kooien zien we vaak dat de man na een aantal weken de jongen achterna gaat wat voor onrust zorgt. Tijdens het broeden is het ook belangrijk de man goed in de gaten te houden of hij de pop met rust laat. Dit kan per koppel verschillen. Wanneer een man lastig is kunt u hem het beste apart zetten in het zicht van de pop. Zo blijft hij in broedstemming en hoeft er niet opnieuw gekoppeld te worden voor een volgende ronde. Een popje kan in principe prima alleen de jongen groot brengen al heeft het natuurlijk de voorkeur dat een koppel dit samen doet. Jonge tangara's zijn na ongeveer 35 dagen zelfstandig.

Ziekten & gezondheid

Tangara's zijn geen vogels die zich zomaar aanpassen aan allerlei omstandigheden. Dit vraagt van liefhebbers om zich hier van bewust te zijn. Niets is meer frustrerend dan regelmatige uitval van vogels die toch al zo moeilijk verkrijgbaar zijn en tegenwoordig ook nog eens behoorlijk prijzig zijn. Dit is nooit helemaal te voorkomen maar als u een aantal stelregels in acht neemt is de kans hierop wel veel kleiner. Hygiëne is belangrijk. Maar iedereen die zijn verblijven en met name de zitstokken en voer/waterbakken normaal schoon houdt zal hierdoor weinig ziekten in de hokken krijgen. Vooral nieuw aangeschafte vogels kunnen een bron van ziektekiemen binnen brengen en een groot gevaar zijn voor uw vogelbestand. In het stukje 'aanschaf' heeft u hier meer over kunnen lezen.



We hebben o.a. te maken met het feit dat tangara's in veel mindere mate gedomesticeerde vogels zijn dan bijvoorbeeld de zebravink of kanarie. Dit heeft een aantal gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden.

De vogels die wij hebben zijn daardoor waarschijnlijk minder bestand tegen de omstandigheden hier. Naarmate er verder door gefokt wordt, en als het ware kweekstammen van tangara soorten opgebouwd worden, zullen die tangara's waarschijnlijk minder vatbaar worden. Het is te hopen dat meer gedomesticeerde tangara's minder gevoelig voor stress worden.

Het is niet wetenschappelijk onderzocht, maar ervaringen van liefhebbers geven aan dat stress een belangrijke factor speelt in het wel of niet ziek worden van tangara's. En met name de gevoeligheid voor schimmels neemt dan sterk toe. Een tweede punt is dat wij veelal afhankelijk zijn van nieuw aangekochte vogels, wanneer er een vogel uitvalt bijvoorbeeld. En hier schuilt het grootste gevaar.

Groothandelaar in:

- * papegaaien
- * parkieten
- * exotische vogels
- * reptielen



De Hoogt 30 – 5175 AX LOON OP ZAND

Tel: 0416-365240

Fax: 0416-365241

www.animaltradingcompany.nl

E-mail: atc@bart.nl

Animal Trading Company

Deze vogels dragen vaak veel ziekteverwekkers bij zich.

De basis voor een goede gezondheid bij tangara's is afhankelijk van meerdere factoren. Het begint bij een goede algemene hygiëne. Goede huisvesting en geschikte voeding zijn belangrijk. Maar ook een goed contact met een vogelarts is belangrijk. Op het moment dat er een ziekte is moet er snel gehandeld kunnen worden en is het belangrijk dat een vogelarts weet wat er speelt. En u weet waar u moet zijn. Zonder een juiste diagnose is elk middel een probaat middel waardoor het uiteindelijke juiste middel wel eens te laat kan komen.

Tot slot

In dit artikel is vrij globaal ingegaan op een aantal thema's rond het houden van tangara's. De informatie is vooral gebaseerd op ervaringen en de ervaring van bevriende en bekende tangara liefhebbers. Heeft u vragen over tangara's? Op www.tanagerbreeders.nl vindt u informatie over alle bovengenoemde thema's. Ook zijn daar diverse kweekverslagen, soortbeschrijvingen en veel prachtige foto's te vinden. Ook kunt u mij voor vragen mailen via onderstaand emailadres.

Arjen den Boer

info@tanagerbreeders.nl

Foto's middenstuk;

- Boven; Kastanjerug tangara (*Tangara preciosa*).
- Midden; Purpermasker tangara (*Tangara larvata*) en een Blauwe pitpit (*Dacnis cayana*).
- Onder; Roodnek tangara (*Tangara cyanocephala*)

Foto's van internet.