

EIGEN KWEEK GOUDTANGARA - Tangara arthus.

Door: M. Maarleveld

Nu ik dit schrijf is het derde legsel ook al uitgevlogen. Het zijn twee jongen. Maar laat ik bij het begin beginnen. In juni kocht ik een stel goudtangara's. Ze bleken niet al te best en na drie dagen lag de pop dan ook inderdaad op haar rug. Ik kon een andere pop krijgen, want er waren wat nieuwe vogels binnengekomen. Ik besloot er tegelijk toch maar een man bij te nemen, want in de eerste had ik niet zoveel vertrouwen. Dat was goed gezien, want bij thuiskomst bleek de eerste man ook dood in zijn kooi te liggen. Ik moest dus meteen met een heel nieuw stel beginnen. Ze droegen niet alleen de naam Goudtangara's, het bleek ook een gouden stel dat gouden eieren legde die op hun beurt weer jonge tangara's opleverden. Wat bleek? Na een maand in de volière te hebben doorgebracht waren zij kennelijk zo geacclimatiseerd dat ze begonnen te nestelen in een open nestbakje in het buitenvluchtje van 1m breed, 1,5m lang en 2,5m hoog. 2 Eitjes werden gelegd in de kleur blauwgrijs bruin gespikkeld. Na drie weken broeden bleken de eieren onbezet.

Toen ik op een zondag in de veranda zat, zag ik twee keer een paring van het stel. Nu begonnen ze te nestelen in een berkenblok. Veel hoop gaf ik ze niet, want het werd al vroeg donker en alleen de binnenvolière is verlicht.

Twee weken voor de Kleurvogeltentoonstelling kwamen er twee jongen uit, maar na vijf dagen waren ze beide reeds dood. Waarschijnlijk een te korte dag en een te lange nacht, hetgeen een korte voedermogelijkheid inhoudt. Ik heb toen eerst mijn binnenvolière in orde gemaakt, de bodem moest waterdicht worden gemaakt, het geheel wat opgepoetst en toen mochten ze met een stel Heini-, Zwartoor-, Paradijstangara's en een stel violet Sunbirds weer de volière in. Ik had meteen wat nestgelegenheden opgehangen. Of er niets was gebeurd begonnen ze meteen te nestelen in een stammetje met gestoken groen. Er werd een mooi nestje gevlochten van hoofdzakelijk kokosvezel. De snelheid waarmee dit gebeurde verbaasde mij wat. Voor dat ik er erg in had waren ze aan het broeden, de pop althans, want die broedt en verzorgt voor het grootste deel de jongen. Ik wist niet precies wanneer het eerste ei gelegd was, maar na een week hoorde ik al heel zacht piepen. En ja hoor: twee jongen, kaal met wat donker dons op kop en rug.

Terug rekenend was de volgorde dus: 25 november: twee eieren, uitgekomen 8 december. Aangezien ze in de binnenvolière zaten moest ik al het levend voer zelf aandragen. Geknipte meelwormen (het liefst witte) 40 tot 60 per dag, pinky's, meelmaden, miereneieren, geweekt brood, in honing geweekt Cédé en



HEVRO V.O.F.



Groothandel in vogels en knaagdieren

Telefoon
040-2550018

Fax
040-255931

Mobiel
06-54988783


Dennenstraat 1
5616 LT Eindhoven

Openingstijden voor particulieren:
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
of volgens afspraak.


In- en verkoop van alle soorten vogels.
Wij kopen wekelijks vogels op en betalen steeds
de HOOGSTE prijzen.

Vogels kunnen in overleg worden opgehaald.

Tevens bieden wij u aan: Vruchten- en insectenetende
vogels, zaadeters, duiven, Zuid-Amerikaanse sijzen.
Nakweek en mutanten.



HEVRO V.O.F.





Bijzondere Dieren Praktijk "den Horst"
voor vogels, reptielen, knaagdieren en konijnen.

Wintelresedijk 51,
5507 PP Veldhoven.
tel: 040-2053097

Openingstijden: maandag en donderdag 09.00-18.30 uur
dinsdag, woensdag en vrijdag 09.00-17.00 uur

Dierenarts: Hedwig van der Horst

Aluminium volièrès

pb
Aluminium

Hoofdstraat 58
5683 AG Best
Voor informatie:
Tel. 0499-374395
Fax 0499-375048
Mobiel 06-53649512

Zaterdags geopend
van 9.00 tot 15.00 u.

EUROKOOI

- Volièrès naar uw eigen idee
- Kompleet of in onderdelen
- Onderhoudsvrij aluminium
- Diverse kleuren op voorraad
- Garantie op poedercoating

universeelvoer, fruit: appel, peer, banaan, druif en mandarijn, allemaal klein gesneden. Als drank kregen zij nectar drank. Deze is samengesteld uit druiven-suiker, honing en water. Dit drankje wordt rood gemaakt met intensief. Bederf hiervan is minimaal. Tevens kregen ze een flesje nectarvoeding. Dit is samengesteld uit: rijstebloem, melkpoeder (Nutri-soja), Cédé, universeel, gierst en zeewier. Dit alles tot poeder gemalen en met water aangemaakt. Vers water wordt aangevoerd door een vijvertje met stromend water. Elke morgen begon ik om 7 uur met de drank, mierencieren, fruit, brood en meelwormen. Om 12 uur vers fruit en mierencieren en om 16 uur verse nectar, brood geweekt in nectar, meelwormen en fruit. Na tien dagen heb ik ze geringd met een kanarie-ring ringmaat 2.9mm die van tevoren met een viltstift was zwartgemaakt. Toen de jongen na 15 dagen uitvlogen waren de ringen mooi blank. Dat uitvliegen werd veroorzaakt door een controle die ik wilde doen. Bij het afhalen van het nest vlogen ze, voor ik goed en wel zag wat er gebeurde, een voor een eruit. Het terugzetten lukte niet, ze bleven eigenwijs. Doordat het oudcrpaar als gekken tekeer ging, dacht ik: Zock het dan zelf maar uit. En dat gebeurde dan ook. Ik liet ze zoveel mogelijk met rust.

Precies een week later op 25 december bleek dat de pop weer op het nest zat. Toen ze 's avonds aan het eten waren bleek bij controle dat er weer twee eitjes in het nestje lagen. Daarvan vond ik later een op de bodem van de volière. Het jong dat uit het overgebleven ei is gekomen heb ik ook geringd en zat zaterdag 24 januari zachtjes piepend boven in een plant. Ik kreeg daar erg in doordat het door de pop werd gevoerd. Dat deed zij met haastig naar binnen-geschrokt vers aangemaakt Cédé.

Het geboorteproces herhaalde zich aldus drie keer. Op 1 februari 2 eitjes en op 15 februari 2 jongen. Ik vond het zo wel mooi, maar er zit nu eenmaal geen knop op waarmee je ze kunt stopzetten. Het verloop van het broedproces was als volgt: Twee eitjes per keer, 13-14 dagen broeden en de 15-17de dag uitvliegen. Ook was het steeds een popje en een man per nest.

Alleen de pop broedde en verzorgde de jongen. Als een der jongen was uitvlogen werd dit eerst door de pop gevoerd en daarna het jong dat in het nest was achtergebleven.

Na het uitvliegen waren de jongen pas na drie weken zelfstandig. Kleur van de jongen: okergeel. Bij het popje was het zwart op het kopje duidelijk zichtbaar, het mannetje miste dit. In de volière met de maten 3 meter lang, 80 cm breed en 2 meter hoog was noch van het broedende paar, noch van de andere vogels enige agressie te merken. Ook het oudste jong werd niets in de weg gelegd. Dit in tegenstelling tot wat sommige boeken vermelden.

Tot nu toe moet worden gezegd dat alles prima verloopt. Maar het is wel zo dat 80% een natuurlijk resultaat is en de resterende 20% moet worden opgebracht

door de vogelliefhebber.

Kan dat laatste niet worden opgebracht, dan zijn de vogels ook nergens. Zo belangrijk is dat!!

Tijdens het schrijven van de laatste regels van dit artikel, heden 9 maart, kom ik tot de ontdekking dat het popje van de goudtangara's weer zit te broeden op twee eitjes.

DIERGAARDE BLIJDORP EN ZIJN REUZEN- of TOCO TOEKANS

Ramphastos toco.

Door Ger Essenberg.

Karakteristieke vogels die niet weg te denken zijn uit de collectie van diergaarde Blijdorp, en die vaak door hun enorme snavel bewondering van onze bezoekers afdwingen.

Deze toekans die van oorsprong in de tropische regenwouden van Brazilië, Paraguay, Bolivia en Argentinië leven, bewonen sinds oktober 1992 een van de voliëres in de Victoriaserre.

Ook is een paar van deze prachtige vogels te zien in onze fazanterie.

Levenswijze.

In de tropische regenwouden leven zij in kleine groepjes van zo'n 10 vogels. Toekans zijn echte boomvogels die zelden op de grond komen, ook niet om te eten. Als echte vruchteneters halen zij het talrijke voer uit de bomen.

Naast de vele soorten vruchten versmaden zij ook kleine vogeltjes, zoogdiertjes, slangen en hagedissen niet, spechtennesten worden graag leeg gehaald. Als zij bessen plukken gooien ze deze eerst omhoog om ze dan op een handige manier op te vangen in hun lange snavel.

Het zijn slechte vliegers, zij vliegen in een soort golvende beweging en hun vlucht duurt nooit lang.

Vroeg in de ochtend en avond laten zij hun karakteristieke luide roep horen, ook als ze opgeschrikt zijn weten zij zich goed te roeren.

Snavel.

De snavel lijkt zwaar, maar is het beslist niet. Hij bestaat nl. uit een dunne hoornachtige buitenkant, terwijl de binnenkant uit een soort netwerk van beenweefsel bestaat. De snavelranden hebben een zaagachtige vorm. De bovensnavel loopt uit tot een gebogen punt, hiermee kan hij de kleinste besjes