

nesten hebben een zij-ingang van tenminste 8 cm lang en aan het einde van deze gang is de broedkamer. Deze is met grassen en haren gevoerd. De broedtijd is ongeveer vanaf april tot en met juni, er worden 3 - 5 eieren gelegd. Zover ik weet zijn er bij particulieren nog geen broedresultaten voorgekomen. In de gespecialiseerde vogelparken en dieren-tuinen echter wel.

Met een prima insectenvoer, aangevuld met een rijke schakering van levend voer met diverse bessensoorten e.d. moet bij de vergevorderde vogelliefhebber het ook eens lukken om met deze vogels te fokken. Succes er mee.

## **FOKVERSLAG VAN DE PURPER-SUIKERVOGEL - *Cyanerpes caeruleus*.**

**Door: Ruud van der Donk / foto's auteur.**

Algemeen.

Suikervogels zijn kleine nectaretende tangara's die behoren tot het geslacht *Cyanerpes*. Het geslacht kent globaal gezegd 4 soorten, namelijk de Purper-, de Geelpootsuikervogel ( beide met gele poten), de Kortsnavel - en de Roodpootsuikervogel (beide met rode poten) met diverse ondersoorten.

De vogels komen voor in Midden-Amerika tot de bovenste helft van Zuid-Amerika.

Tussen de pop en de man is duidelijk verschil; de mannetjes zijn prachtig purperblauw en de popjes groen met witte streepjes om de borst en buik. De vogels hebben een zwarte, licht gebogen snavel waarvan zij handig gebruik maken om de dichte bloemen te openen en kleine insecten te vangen.

In de vrije natuur komen zij gelukkig nog algemeen voor mede omdat zij zich aangepast hebben aan de moderne landbouw. De vogels nemen namelijk gebruik van de enorme plantages waar allerlei vruchten worden verbouwd en nemen tevens deel aan de bestuiving van de bloemen. Een punt van zorg zijn echter wel de insectenbestrijdingsmiddelen die in deze landen gebruikt worden.

Huisvesting en voeding.

In het najaar 2000 werden de Purpersuikervogels aangeschaft bij een

bekende vogelhandel in Wamel. De vogels waren eigen import uit Suriname. Er waren zowel Roodpoot- als Purpersuikervogels te koop. Na enige twijfel heb ik toch gekozen voor de purpers, omdat de mannetjes het hele jaar door hun blauwe bevedering behouden en de roodpoot alleen tijdens de broedtijd zijn blauwe veren laat zien.

De Purpersuikervogels werden thuis in een verwarmde ruimte geplaatst in een volière van circa 2 meter.

De temperatuur in deze ruimte komt niet onder de 20 °C. De vogels namen gelijk nectar op en even later waren beide vogels in bad geweest, een garantie dat de vogels gezond zijn. De nectar (Aves) wordt dagelijks tezamen met vers eivoer (Aves) verstrekt. Tevens krijgen de vogels dagelijks wasmotten die ik zelf kweek en naar mijn mening een onmisbaar voer is om een fokresultaat te realiseren met elke insectenetende vogelsoort.

Fok.

In mei is de schuif naar de buitenvolière geopend en wordt er een stel Gestreepte baardvogels (tinckerbirds -*Pogoniulus spec.*) en een stel Lazuli vinken bij de Purpersuikervogels geplaatst.

Wanneer de purpers de ruim beplante volière betreden komen zij pas echt tot hun recht, zeker wanneer de zon schijnt. Het zijn zeer actieve vogels en ware juweeltjes. In juni zie ik het mannetje regelmatig baltsen en achter het popje aanjagen. De balts bestaat uit het opzetten van zijn veren tot een rond balletje. Verder maakt hij met zijn kopje schuddende bewegingen en laat daarbij een zacht mooi gezang horen. Hierna wordt de achtervolging van het popje ingezet en gaat het er soms heftig aan toe.

Begin juni ben ik het popje in de buitenvolière kwijt en ik vrees het ergste omdat ik niks van nestbouw had gezien. Tijdens het voeren zie ik plotseling in het nachtverblijf het popje van een rieten nestje afspringen en bij controle blijken er 2 enorme eitjes in te liggen. Het nestje was een voorgevormd touwnestje waarvan het popje zelf met sisal de rand had opgehoogd.

Na 12 dagen kwam het 1e ei uit en een dag later het 2e. Nu begon het pas echt want waar haal je klein levend voer vandaan. Gelukkig kreeg ik een tip van een wildzangkweker om groene bladluizen te vangen. Makkelijker gezegd dan gedaan, mijn vader werd op pad gestuurd met een emmer om brandnetels uit te slaan. En inderdaad, bij het openen van de emmer waren veel groene beestjes te zien, nl. luizen, wantsen en kleine spinnen. De emmer werd in de kooi geplaatst en de deur was nog niet dicht of het popje was volop aan het eten en ging meteen de jongen voeren. Dus een groot succes wat echter wel inhield dat dit da-



**Vogelhandel**



**"De Bosruiter"**



Het adres voor Uw Vruchten- en insecteneters  
als ook zangvogels, waaronder Kardinalen-Lijsters-  
Kernbijters-Vinken-Sijzen enz.....

Vragen naar: *Jack Evers.*

Emmastraat 112, 4711 AV St. Willebrord,  
Verkoop vogels na telefonische afspraak.

Tel./Fax. 0165-382782 - 06-53594006  
E-mail adres: [bosruiter@hetnet.nl](mailto:bosruiter@hetnet.nl)

*Een goede verzorging is van belang, het wordt beloond in kleur en zang.*



**In 't Groen**  
**Reigersbosweg 8c**  
**5144 MA Waalwijk**



**Diervoeders &**  
**Dierbenodigdheden**

**Tel.: 0416-651433 Fax: 0416-349960**  
**Internet: [www.in het groen.nl](http://www.in het groen.nl)**

gelijks moest gebeuren. Het popje voerde later ook stukjes vers eivoer, nectar en wasmotten.

Het eivoer (hard gekookt ei met beschuit en Aves opfok  $\Lambda$ ) moest vers zijn en meerdere keren per dag gegeven worden, zeker omdat de zomer erg warm en droog was. De wasmotten werden alleen gegeten wanneer ze behoorlijk groot waren en werden eerst dood geknepen in de kop.

Miereneitjes werden ook verstrekt maar waren snel verdroogd.

Het mannetje voerde zijn popje, niet de jongen en liet alles aan het popje over. Na het uitkomen zijn de jongen erg donker van kleur en na een week komen de eerste veren door. De vogels beginnen steeds meer wasmotten op te nemen (75 per dag) en groeien goed. Het verschil in grootte tussen de jongen blijft je goed zien. Ze lijken op het popje, maar zijn veel kleiner en hebben een kort staartje.

Op 2 juli ben ik 's morgens in de kooi en zie ik een van de jongen op de grond zitten. Ik wil hem oppakken maar meteen komt het popje luid protesterend het binnenverblijf binnen gevlogen en lokt de jonge vogel de buitenvolière in; een prachtig gezicht. De vogels hebben 14 dagen in het nest gezeten en zoeken meteen de bescherming op van de dicht beplante volière. De vogels zijn echt onvindbaar en zijn zo klein dat ik zelfs vrees dat ze door het gaas heen kunnen. Op 3 juli 's avonds zie ik een van de suikervogels aan het gaas hangen, maar binnen een half uur vliegt hij achter zijn moeder aan. Van het tweede jong echter geen spoor. Op 4 juli, ook weer 's avonds, zie ik het tweede jong rondvliegen. Het popje blijft de jongen lang voeren en na 2 weken komt het mannetje zich er mee bemoeien en vindt dat het tijd wordt voor een tweede ronde. Hierdoor worden de jonge vogels aangevallen wanneer het popje de jongen wil voeren. Het mannetje heb ik apart gezet. De jongen worden nu weer goed gevoerd met eivoer en wasmotten.

De jongste vogel begon echter steeds moeilijker te vliegen en had moeite met slikken. Omdat het popje hem steeds naar buiten lokte en hij op de grond bleef zitten en niet meer omhoog kon komen, heb ik hem bij het opgekooide mannetje geplaatst. De jonge vogel dronk zelf al nectar en tot mijn grote verbazing begon het mannetje eivoer en wasmotten te voeren. De jonge vogel had waarschijnlijk een schimmelinfectie in de keel en is behandeld met nystatine in de nectar. De jongen zijn later bij elkaar gezet in het binnenverblijf.

Het fokpaar is tot half november de mogelijkheid gegeven om in de buitenvolière rond te vliegen. Ze kunnen, eenmaal geacclimatiseerd, best tegen een stootje.

Tot slot.

Suikervogels zijn voor iedere liefhebber die investeren in huisvesting en voeding een prachtige aanwinst in de volière. Indien men zelfs tijd wil vrij maken om voedseldieren te verzamelen in de vrije natuur is het mogelijk om met deze vogeltjes te fokken.

Het fokken van deze vogeltjes en vele andere soorten zal zelfs noodzakelijk worden om onze hobby in stand te houden. De wetgeving omtrent invoer van vogels wordt steeds verder aangescherpt en wellicht volgen er straks verboden. Verder wil ik mijn vader bedanken die mijn steun is bij het verzorgen en fokken van mijn vogels en zeker bij het vangen van voedseldieren die hebben bijgedragen tot het fokresultaat van twee Purpersuikervogels.

Telefoon 073 6218014.

## **ONZE FOK MET DE ORANJEBUIK-VLIEGENVANGER - *Niltava sundara* en de JAPANSE NACHTEGAAL - *Leiothrix lutea*.**

**Door Jaap Kingma / foto Jan Blasman.**

Korte beschrijving van de Oranjebuik vliegenvanger

In Zuidoost-Azië leven 3 ondersoorten in een gebied dat zich uitstrekt van Pakistan via het Himalayagebergte tot Noord-Birma en Zuid-China. In tegenstelling tot andere vliegenvangers is het een bewoner van de onderbegroeiing van kreupelhout en dicht struikgewas. Bij de jacht op insecten kan hij net als ons roodborstje bliksemsnel toeschieten. Het is een broedvogel van halfopen en gedeeltelijk open holen. Ze leven gewoonlijk in de buurt van watervallen. In de zomer tot op hoogten van 1500 tot 2500 meter, in de winter in lagere streken langs de bergellingen.

Het vrouwtje van de nominaatvorm heeft een overwegend olijfbruin verenkleed, de twee ondersoorten zijn meer grijs - grauwbrown. Ook verschillen ze qua kopvorm en snavelgrootte. Bij oudere exemplaren is de witte sikkelvormige keelvlek intensiever en uitdrukkelijk aanwezig. De lengte bedraagt ongeveer 16,5 cm.