

## Kweekverslag zwartvleugeltangara - *Piranga olivacea*

Door Simon Dennis

Uit Vogelexpressie 2024-5

### Algemeen

De zwartvleugeltangara is een vogel die 16-19 cm groot is. Het mannetje heeft een winter- en een zomerkleed. In de winter lijkt hij sterk op het vrouwtje. Beide hebben dan een geel grijze kleur met donkere vleugels en staart. Bij het mannetje zijn deze intens zwart gekleurd, bij het vrouwtje wat meer grijzig. In de broedperiode kleurt de man intens rood, op de vleugels en de staart na. Deze blijven zwart.

De zwartvleugeltangara werd tot voor kort nog ingedeeld bij de tangara's (Thraupidae) maar behoort sinds kort tot de kardinalen (Cardinalidae). Het is een fruit- en insecteneter. Ze vangen dan vooral vliegende insecten in de vlucht.



Foto boven; zwartvleugel tangara, man, Birds of the World, Ryan Sanderson

De vogels trekken naar het noorden om te broeden en terug naar Zuid-Amerika om te overwinteren. Een nest bestaat gemiddeld uit vier eieren. Hier broedt het popje 11-14 dagen op. Na negen tot twaalf dagen verlaten de jongen het nest.

### Houden

De vogels zitten het hele jaar door buiten. In de winter zitten ze in een gemeenschappelijke volière samen met de zwarte tangara, *Tachyphonus rufus*. De volière is volledig overdekt en is dichtgemaakt met polycarbonaatplaten zodat er ook weinig tot geen tocht is. Ze kunnen zich terugtrekken in een vorstvrij nachthok. In de kweekperiode zet ik ze apart in een kweekvlucht van 1 bij 1 meter en 2.10 meter hoog. Deze vlucht is volledig overdekt. Er staat een olijfbom in en er is ook wat kunstgroen aangebracht. Aan de zijkanten hangen rietmatten zodat ze wat rustiger zitten. In deze volière hebben ze in de voormiddag zon. Na de middag ligt de vlucht volledig in de schaduw.

## Voeding

Qua voeding krijgen ze dagelijks vers fruit. Dit verschilt per dag en bestaat afwisselend uit peer, appel, papaja, mango, blauwe bes en druiven. Hier wordt ook Mazuri en de tangara korrel van Unica aan toegevoegd. Soms meng ik er wat diepvriesinsecten erdoor. Het voedsel wordt 's avonds klaargemaakt en bewaard in de koelkast. Hierdoor worden de korrels ook zachter. Daarnaast krijgen ze ook droge korrel (ook van Unica en Mazuri) aangeboden. Tevens bied ik ze tweemaal per week nectar aan, maar daar drinken ze beduidend minder van dan de andere soorten. Het water wordt dagelijks verversd om bacteriën te vermijden.



Foto boven; zwartvleugel tangara pop, Birds of the world, Terence Zahner

## Kweek

De vogels werden eind april in hun kweekvlucht geplaatst. Ze kunnen hier kiezen tussen twee nestmogelijkheden namelijk een traliekastje met een kokosnestje erin en ook een driehoekig/nestkapel voor inheemse vogels bestaande uit kunstgroen maatje M. In mijn ogen werkt dit laatste voor de meeste soorten tangara's het beste. De vogels plukten vaak blaadjes van de olijfboom en legden deze in de verschillende etensbakjes. Het gedrag hierachter snap ik nog steeds niet, maar iets in me zei dat dit het teken was dat ze een nest wilden maken.

Begin juni werd er dan eindelijk een nest gemaakt van kokosvezels. In dit kommetje werden drie eitjes gelegd. Twee hiervan kwamen na 14 dagen broeden uit. De jongen werden gevoerd met pinkies, wasmotlarven en buffalo's, allemaal uit de diepvries. Ook kregen ze af en toe wat levende buffalo's. De jongen werden na vijf dagen geringd met ringmaat 2,9 millimeter. Na 14 dagen vlogen ze uit. Nu is het wachten op een volgend nest.



Foto links; ei van de zwartvleugel tangara.

Foto rechts; pasgeboren zwartvleugel tangara.

De man was hier niet in broedkleed. Ik hoorde van andere kwekers dat niet elke man op kleur komt. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een ontbrekende stof in het dieet. Zelf geef ik geen rode kleurstof aan de vogels.



Foto rechts; jonge zwartvleugel tangara.

Foto links; verblijf gebied zwartvleugel tangara.