

Op een leeftijd van 16 dagen zaten ze geheel in de veren en vlogen ze na 17 dagen op 9 juli uit het nest.

Op 12 juli 06.30 uur zat de pop dik in de veren, slechte nacht gehad?

Ik ging met enige zorg naar mijn werk met de hoop dat er niets aan de hand was. 's Avonds toen ik thuis kwam vond ik haar dood in het binnenverblijf liggen.

Gelukkig bleef de man alleen de jongen voeren en ze groeiden als kool.

Op 28 juli gingen we met vakantie en tot die tijd werden de jongen in ieder geval gevoerd door de man.

Terug van vakantie op 11 augustus waren de jongen geheel zelfstandig.

Tijdens de broedtijd waren de ouders fel tegenover de vliegenvangers, buulbuuls en Japanse nachtegalen.

Toen de jongen er eenmaal waren werden ze agressief tegenover dezelfde vogels als deze in het binnenverblijf kwamen.

Waarschijnlijk zijn hierdoor slachtoffers gevallen zoals de 0-1 Japanse nachtegaal en het paartje Verditer vliegenvangers.

## **FOKVERSLAG MET DE ROODPOOT - of BLAUWE SUIKERVOGEL -**

### **Cyanerpes cyaneus.**

**Door: Alex Mulder - foto's auteur.**

Met deze suikervogels wordt af en toe gefokt en is daardoor niet zeldzaam meer. De soort heeft een sterke drang tot voortplanting en zal in enigszins gunstige omstandigheden tot nestelen overgaan.

Desondanks vind ik elk gefokt jong toch weer een prestatie aangezien er veel tijd en energie in gestoken moet worden om een jong gezond op stok te krijgen. Het grootste probleem is om voldoende geschikt levend voer aan te leveren, zeker in de winter. Vorig jaar is het me gelukt om 1 jong op stok te krijgen maar door te weinig geschikt (levend) voer is het jong maar 1½ maand oud geworden. De twee jongen groeiden langzaam en hadden niet veel weerstand; het jongste jong was binnen 6 dagen dood.

Dit jaar is het een stuk beter gegaan; ik heb nu zelfs 2 sterke gezonde jongen rondvliegen.

Het vrouwtje wil bij mij tot nu toe (ik heb ze 3 jaar) altijd in de winter nestelen. Dit heeft denk ik te maken met hun broedperiode in Zuid-Amerika. Hoewel het mannetje zich afgelopen zomer wel voor het eerst had aangepast (hij had in juli al zijn mooie blauwe kleur) heeft het vrouwtje in de buitenvolière geen nesteldrang getoond. In december '99 begon het vrouwtje wel met nestbouw in een kleine binnenvolière op zolder. Het mannetje was inmiddels weer groen gekleurd en ik was benieuwd of de eieren ook bevrucht waren. Niet dus. Binnen 12 dagen was het vrouwtje ook al gestopt met broeden dus ik denk dat zij het ook wel door had dat het niet helemaal goed zat. Het mannetje heeft zich vanaf het moment van broeden razendsnel aangepast aan de omstandigheden en heeft zijn mooie blauwe kleed weer snel terug gekregen.

Het tweede legsel liet niet lang op zich wachten en na 12 dagen broeden werd het eerste jong geboren, het tweede volgde een dag later. Ik heb ze het volgende levend voer gegeven: kleine (mini) meelwormpjes (1cm), mieren eitjes en wasmotlarfjes. Vooral de jonge mini meelwormpjes worden veel gevoerd, de grootte is echt van belang. Ik koop meestal een kilo mini meelwormpjes bij een kweker. Ik heb eerder meegemaakt dat de ouders grote meelwormen aan de kleine jongen probeerden te voeren, bij gebrek aan beter. De jongen kunnen dit duidelijk niet verteren en gaan dood. De jonge meelwormen geef ik een mengsel van kuikenmeel, vruchtenpaté, zemelen, schijfjes appel en sla.

Om in de korte winterdagen toch voldoende lichturen te krijgen maak ik gebruik van een lichtschakeling die er voor zorgt dat 's morgens om 7 uur het licht langzaam aanzwelt en weer langzaam uitgaat als er voldoende licht is. Zodra het weer donker begint te worden zwelt de lamp weer langzaam aan om 's avonds om 10 uur weer langzaam te dimmen.

De vogels geef ik het volgende fruit: banaan, papaja en peer, verder vruchtenpaté met gewelde rozijnen. De jongen worden gevoerd door beide ouders, waarbij het vrouwtje zo'n 90% voor haar rekening neemt. Ik heb wel eens gehoord/gelezen dat sommige kwekers het mannetje weg moeten halen omdat die agressief wordt. Dit is bij mij duidelijk niet het geval, het vrouwtje is dominant en de man heeft niet veel in te brengen. Zelfs tegenover de aanzienlijk grotere Veelkleurentangara's is zij dominant tijdens de broedperiode. Ze gaat af en toe de confrontatie aan met een Veelkleurentangara wat meestal resulteert in het verlies van veren, meestal op de buik, maar ze blijft de baas. Deze gedreven felheid maakt het mogelijk dat ze zelfs in een kleine binnenvolière samen met 4 Veelkleurentangara's in staat is om jongen groot te brengen. Aan de jongen valt me op dat ze zo buitengewoon tam zijn. In de binnen-



**Import vanuit:**

China, Indonesië, div. Afrikaanse landen,  
Mexico, Suriname, Peru, Pakistan etc...

**Voorradig: Insecteneters, vinken, papegaaien etc...**


## **Vogelhuis Kloeg**

De Hil 4a 4762 AG Zevenbergen  
tel. 0168-327292 - fax. 0168-329929

**Openingstijden:**

Maandag t/m/ vrijdag 9.00 - 16.00 uur

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur.



**Vragen??? Problemen??**

**Bijzondere Dieren Praktijk "den Horst"**

voor vogels, reptielen, knaagdieren en konijnen.

Wintelresedijk 51,  
5507 PP Veldhoven.  
tel: 040-2053097

**Openingstijden: maandag en donderdag**  
dinsdag, woensdag en vrijdag

**09.00-18.30 uur**

**09.00-17.00 uur**

**Dierenarts: Hedwig van der Horst**

volière vliegen ze soms bij mij op de schouder, en blijven gewoon op een vinger zitten. Ik denk en hoop eigenlijk ook, dat als ze in het voorjaar naar de buitenvolière gaan weer wat gaan verwilderen.  
De ouders zijn inmiddels weer met een nieuw nest begonnen.

## **FOK MET DE HALSBAND VINK- SNAVELBUULBUUL -**

### **Spiziox s. semitorques**

**Door: Peter Joossen**

Mijn Halsband vinksnavelbuulbuuls heb ik nu bijna een jaar in bezit. Bij een andere liefhebber hebben ze al eerder jongen gehad, maar deze had een grote volièrre van 10 bij 8 meter. Bij mij zitten ze veel kleiner en wel in een buitenvolièrre van 3 bij 1,5 bij 2 meter. Ze delen deze ruimte met een paartje Grijsruglijsters en een paartje Roodstaartminla's.

Het vluchtje is begroeid met fijnspar, vlier en conifeer. Er liggen ook veel oude stronken in en verder zijn de wanden aangekleed met coniferengroen en brem. Eind april heb ik er verschillende traliekastjes ingehangen die ik ook voor mijn andere lijsters gebruik. Ze zijn 20 bij 20 bij 30 cm.

De minla's en de grijsruglijsters begonnen in mei al te nestelen. De vinksnavelbuulbuuls maakten nog geen aanstalten. Wel hadden ze af en toe schitterende melodieuze ductten en ze konden ook flink tekeer gaan bij onraad. Begin juli was het dan zover. In een van de traliekastjes had ik een oud merelnest gestopt en daar lagen nu tot mijn verbazing twee eitjes in, wat kleiner dan die van de zanglijster. Ze waren gevlekt met vooral aan de stompe kant een krans van roseviolette vlekjes. Dit was op 3 juli. Ik heb ze nooit zien nestelen, sterker nog, ik heb ze zelden zien broeden. Een keer zag ik er een vanuit de keuken het bakje ingaan. Toen ik naar buiten ging, zaten ze allebei in de volièrre en zo was het altijd.

Beide vogels nemen graag een bad en zijn verzot op appel en pinky's. Alle vogels krijgen een basisvoedsel van goed universeel en fruitmix van Witte Molen. Verder krijgen ze elke dag witte meelwormen, eivoer van Aves, pinky's en natuurlijk veel fruit.

Op 4 juli onweerde het 's avonds hevig. Na afloop ging ik even kijken en het kopje van de vinksnavelbuulbuul kwam uit het bakje. Ze broedden dus. Op 19 juli keek ik met een spiegelkje in het nest en naast een eitje zag ik een klein naakt jong liggen. Dat was hartstikke leuk, vader buulbuul jakkerde de hele