



Blauwe pitpit *Dacnis cayana*

Fokverslag

Door Paul van der Voort / foto's auteur en internet.

Aanschaf en huisvesting

In juni 2011 heb ik de man gekocht en in oktober van datzelfde jaar kon ik een gesekste pop erbij kopen in Denemarken. Van beide vogels waren nog geen broedresultaten bekend. Ik plaatste ze in een binnenvlucht van 3 x 1 x 2 m. hoog met hierin een paar takken en een kunstkerstboom. Op de bodem stonden 2 emmers met fruitafval om voldoende fruitvliegjes op voorraad te hebben.

Basis- en opfokvoer

Het basisvoedsel bestaat uit Avian-sunbird nectar en een brei van vruchten en eivoer. Het eivoer maak ik als volgt zelf: 180 gram couscous en 275 ml water worden bij elkaar gevoegd en dit laat ik een paar uur staan zodat het goed kan intrekken. Vervolgens voeg ik 6 eieren (middelgroot) toe en mix ik 2 à 3 minuten alles, weer een paar minuutjes laten staan en dan gaat de portie 7 minuten in de magnetron (vol vermogen). Als het goed gegaan is heb ik een mooie "eiercake". Vervolgens laat ik de cake afkoelen en dan maal ik deze in kleine

stukjes met een foodprocessor. Daarna kan het meteen de diepvries in. Bij het dagelijks eivoer maken ontdooi ik 1 portie en voeg er nog een klein schepje Aves Opfok en Aves Insectenstrooipoeder aan toe. Hierna ontdooi ik 1 eetlepel pinky's en 1 eetlepel buffalo's welke ik door het gehele eivoer meng.

Het voedsel wordt aangeboden via meerdere bakken, op een hoogte van 1.25 m.

Fok

In februari begon de man op kleur te komen, bepaald baltsgedrag kon ik niet echt waarnemen. Het open nestje van kokosvezel met een diameter van 3 cm was gemaakt in een korfje in de kunstkerstboom op een hoogte van 1.60 m. Het was keurig afgewerkt.

Op 28 februari lag het eerste ei in het nest, totaal 2 eieren, maar helaas onbevruucht. 22 Maart lag er weer een ei in het nest. Ditmaal ook een legsel van 2. Op 25 maart waren 2 jongen geboren, maar die werden door de man uit het nest gegooid. Spijtig. Hierna ben ik gestopt met het voeren van meelwormen.

16 April een ei en de volgende dag het tweede. De eieren, crèmewit met roodbruine stippen op de stompe kant en 15 x 10 mm groot, werden telkens dag na dag gelegd; de jongen kwamen gelijktijdig uit. Nestcontrole lieten de vogels toe en zover ik kon waarnemen werd gebroed door de pop.

29 April lagen er 2 jongen in het nest, naakt met een weinig dons; de man voerde nu zelfs mee. De jongen werden vanaf de eerste dag gevoerd met fruitvliegjes en eivoer, later werden veel wasmotlarven en darrenbroed gevoerd. Op de 5e dag heb ik het grootste jong geringd met 2,9 mm. Dit jong groeide echt snel.

Na 6 dagen ging de pop 's nachts niet meer op het nest en dit heeft de kleinste niet overleefd. Het overgebleven jong zat al na 10 dagen op de rand van het nest te kijken, de 11e dag zat het op een tak en is ook niet weer in het nest geweest. Het jeugdkleed was iets lichter dan de moeder.

Na 5 weken heb ik het jong van de ouders gescheiden.