

Fokverslag turquoise tangara - *Tangara mexicana*

Door Paul van der Voort / Foto's auteur.

Aanschaf

Ik kocht het koppel begin september (eind van het fokseizoen 2012) om te proberen er in 2013 mee te fokken. Het was import en bijgevolg duidelijk dat er nooit in gevangenschap gebroed was.

Huisvesting

Aanvang oktober plaatste ik in een hok van 3.00 x 3.00 x 2.00 m. met wat kunstgroen al mijn vruchteneters, want fokken was toch niet meer aan de orde. Ze zaten hier samen met 1 koppel roodpootsuikervogel, de masker pitpit, de blauwe pitpit, de violetblauwe organist en 2 koppels geelpootsuikervogels.

Voeding

Als basisvoer verstrek ik een papje van 3 à 4 soorten fruit met daarnaast eivoer. De eivoersamenstelling is van dhr. Alex Mulder: 180 gram couscous en 275 ml water bij elkaar gevoegd en dit een paar uur laten staan zodat het goed kan intrekken. Vervolgens 6 middelgrote eieren toevoegen en 2 à 3 minuten mixen, weer een paar minuutjes laten staan en dan 7 minuten in de magnetron (vol vermogen). Als het goed gegaan is heb je zo een mooie "eiercake". Daarna laten afkoelen en in kleine stukjes malen met een foodprocessor. Ten slotte kan het meteen de diepvries in.

Bij het bereiden van het dagelijks eivoer ontdooi ik 1 portie en voeg er nog een klein schepje Aves Opfok- en Aves Insectenstrooipoeder aan toe. Hierna ontdooi ik 1 eetlepel pinky's en 1 eetlepel buffalo's welke ik door het gehele eivoer meng. Als laatste komt er nog Nutribird Unikomplet, Claus Rood type 1 en Spirulina bij.

Meerdere voerbakken bevinden zich op verschillende hoogten, van 0,5m. tot 1,25m.

Fok

Op 20 oktober vond ik een nest met 1 eitje erin, dit werden er in totaal 3. Het keurig met kokosvezel afgewerkte nestje hing op een hoogte van 1.40 m., zat in een touwnestje in het kunstgroen en had een ►

diameter van 5 cm. De eitjes waren crèmekleurig met veel streepjes en vlekjes onregelmatig verdeeld over de stompe kant. Afmetingen eitjes: 15x12 mm.

Nooit heb ik de tangara's in de buurt van het nest gezien, mij is ook geen baltsgedrag opgevallen en evenmin is mij bekend wie gebroed heeft. Toch lag er op 2 november een mooi jong in het nest. Dag na dag werd 1 jong geboren hetgeen resulteerde in 3 jongen.

De jongen waren naakt, een weinig dons bedekte hun roze huidje; de eerste veren kregen ze na 8 dagen en na 10 dagen gingen de oogjes open. Zodra er jongen waren werden 3 x per dag levende wasmotten, gesneden diepvries krekels en diepvries wasmotlarven door het opfokvoer gemengd. Na 4 dagen was het kleinste jong verdwenen, de 2 overgebleven jongen groeiden voorspoedig en zijn op de 5^e dag geringd met ringmaat 2,9 mm.

Op 18 november - dag 16 - vlogen de jongen uit en keerden niet meer terug op het nest. Hun jeugdkleed was helemaal zwart met een lichte buik en wat blauw aan de kop en op de stuit.

Van agressie jegens de andere vogels was geen sprake; alleen als er werd gevoerd bleef de man bij de voerbak terwijl de pop af en aan vloog met stukjes wasmotlarven en krekels. Het leek net of de man de voerbak bewaakte zodat de rest van de vogels er niet bij kon.

Op 1 december lag het eerste ei van het volgende legsel in het oude nest. In totaal werden er weer 3 eieren gelegd. De jongen van het 1^{ste} legsel werden totaal niet weggejaagd, ook al zaten ze vlak bij het nest. 14 December lagen er 2 jongen in het nest, het 3^e ei was onbevruucht. Nu werden de jongen wel verjaagd hetgeen mij direct deed besluiten om de beide oudere jongen uit het fokverblijf te verwijderen en apart te plaatsen in een broedkooi.

Tot zover het verslag van deze fantastische fok. 

INHOUDSOPGAVE VOGELXPRESSE 2012 - jrg. 41

De inhoudsopgave kunt u downloaden van onze website. Op verzoek wordt deze ook toegezonden.

Tel. 0455444138 of e-mail: p24heijenrath@gmail.com