

Fokverslag

Geelpootsuikervogel - *Cyanerpes caeruleus*



Door Paul van der Voort / foto's
auteur en internet.

Aanschaf en huisvesting

Het koppel geelpootsuikervogels heb ik gekocht in april 2011. Ze werden bij thuiskomst geplaatst op een zolder in een vlucht van 3 x 3 x 2.50 m. hoog aan de voorkant en 1.25 m. hoog aan de achterkant. Ook in deze kooi bevonden zich een paar takken en een kunstkerstboom en op de bodem stonden weer 3 emmers met fruitafval om voldoende fruitvliegjes op voorraad te hebben.

Basis- en opfokvoer

Samenstelling en bereiding eigen eivoer als bij de blauwe pitpit.

Fok

In april begon de man wat zacht te zingen en op 17 april lag er plotse-ling 1 ei in een nest waarvan ik niet wist dat het van de suikervogels was. In totaal werden er 2 eieren gelegd. Deze waren crèmewit met veel stippen over de stompe kant, grootte van de eieren 13 x 10 mm. Baltsgedrag heb ik niet waargenomen, alleen viel mij op dat de man drukker was bij binnenkomst, met name vlak voor het eerste ei gelegd werd. Als nestje deed een met kokosvezel bekleed kanarie/traliekastje dienst. Hierin werd een komvormig nestje van eveneens kokosvezel gemaakt.


Op 30 april, na 12 dagen broeden, lag één jong en een aangepikt ei op de bodem van de kooi. Het jong leefde nog, dus werd het door mij opgewarmd en teruggelegd; het jong in het aangepikte ei was overleden.

Na een uur keek ik nogmaals en weer lag het jong op de grond. Vervolgens heb ik de man verwijderd en toen vloog de pop naar het nest en hield het jong lekker warm en voerde goed.

Help uw resultaten op natuurlijke wijze naar een hoger niveau !

Producten van 'De Imme' dragen bij aan een optimale voeding van uw vogels !

Levert o.a.; Sti-Ho-Dru® - stuifmeelkorrels - spirulina - propolis
vitamine A - C - E - K1- multivitamine - rusk



Voor meer info: www.de-imme.nl

'De Imme'

Kormelinkweg 2 a
7151 NM - Eibergen (NL)
Telefoon: 0545-475202
Fax: 0545-478250
E-mail: info@de-imme.nl

Opfok

De eerste 5 dagen werden er alleen fruitvliegjes gevoerd, vanaf dag 6 begon ik eivoer, wasmotlarven en darrenbroed te missen uit de voerbak. Tevens heb ik de 5e dag het jong geringd met ringmaat 2,7 mm (2,5 was op dat moment te klein). Het groeide snel, na 8 dagen kwamen de eerste veren door. Na 14 dagen is het uitgevlogen. Op 1 juni, ongeveer 5 weken later, heb ik het jong van de moeder gescheiden en heb de man weer bij de pop geplaatst.

In het jeugdkleed leek het jong op de moeder, wel iets donkerder.

Tweede succesvolle fok

Op 6 juni vond ik in hetzelfde nest weer het eerste ei en een dag later nummer twee. Maar deze keer heb ik de man een paar dagen voor het uitkomen uit de kooi gehaald. Één jong werd volwassen en net als bij de vorige fok heb ik dit na 5 weken van de moeder gescheiden.

Noot redactie.

Wij feliciteren Paul van harte met deze prachtige fokresultaten.